

花卉病蟲害

花卉病害

一、玫瑰白粉病

學名：*Sphaerotheca pannosa* (Wallr.) Lev.

英名：Powdery mildew

病徵：本病發生於冬春季。嫩葉被害時捲曲，亦可危害嫩枝、花柄、萼片及最外層花瓣。

傳播途徑：被害葉、嫩枝、花柄、萼片或最外層花瓣病斑上有白粉狀分生孢子以此傳播。

防治方法：任選下表一種藥劑防治

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
50%白克列水分散性粒劑 (Boscalid)	0.4公斤	2,500	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續三次。	具呼吸中等毒。 1.施藥時應將藥液噴射於葉片之上、下兩面。 2.本藥劑試驗時加展著劑「全透力」1000倍。
25%山陽銅乳劑 (SANYOL)	2-5公升	500	發病初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次，連續施藥四至五次。	
18.6%賽福寧乳劑 (Triforine)	1-2.5公升	1,000		
30%白粉松乳劑 (Pyrazophos)	0.4 -0.6公升	2,500	發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次，連續三次。	