

5.玉米園雜草：任選下表一種藥劑防除

藥劑名稱	每公頃施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥時期及方法	注意事項	防除對象
40%乙基克繁草水分散性粒劑 (Carfentrazone-ethyl)	60公克	稀釋至600公升	播種後，雜草約2-3葉時，全面均勻噴施。	1.本藥劑應攪拌均勻後再噴施。 2.具中度皮膚刺激性；對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」	小葉灰藿、鱧腸、馬齒莧、烏莧、金春午時花、刺莧、春蓼、短葉水蜈蚣、心葉母草、長梗滿天星、野莧、藿香薊、早苗蓼、鵝兒腸、昭和草。
50%施圃草脫淨可濕性粉劑 (Pendimethalin + Atrazine)	3公斤	每公頃稀釋至600公升	播種後，玉米萌芽前均勻噴施於土面。		小葉灰藿、早辣蓼、長葉雀稗、山芥菜、碎米莎草、稗草、馬齒莧、短葉水蜈蚣、苦蕒草、野莧。
46.7%撲多草乳劑 (Metobromuron + Metolachlor)	4公升	250	播種覆土後將藥劑均勻噴施於土壤表面。		牛筋草、野莧、早辣蓼、苦蕒草、馬齒莧、龍葵、刺莧、小葉灰藿、山芥菜。
46.3%莫多草淨水懸劑 (Atrazine + Metolachlor)	4公升	250	播種覆土後將藥劑均勻噴施於土壤表面。		牛筋草、野莧、早辣蓼、苦蕒草、馬齒莧、龍葵、刺莧、小葉灰藿、山芥菜。
50%撲奪草可濕性粉劑 (Metobromuron)	4-6公斤	170-250	播種後覆土均勻噴施於土面。		早辣蓼、馬齒莧、刺莧、野莧、龍葵。
45%必汰草脫淨可濕性粉劑 (Pyridate + Atrazine)	2.5公斤	400	播種後雜草2~3葉時全面噴施。	對禾本科雜草防治效果較差。	早辣蓼、馬齒莧、野莧、刺莧、龍葵、小葉灰藿。
77.3%拔敵草乳劑 (Butylate)	4公升	200-300	播種覆土後將藥劑均勻噴施於土面上。		龍葵、野莧菜、碎米莎草、芒稷、牛筋草、狗牙根、大指草、鱧腸、木虱草、節節花、定根草。