

## 二十二、水稻稻蟲類、葉蟬類、椿象類、薊馬類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
50%芬殺松乳劑 (Fenthion)	0.8-1.2 公升	1,000		1.收穫前21天停止施藥。 2.防治稻薊馬。
30%治滅蝨乳劑* (Metolcarb)	1.2-1.5 公升	800	分藥期每隔7天施藥一次。	
50%治滅蝨 可濕性粉劑* (Metolcarb)	0.5-0.6 公斤	2,000	分藥期每隔7天施藥一次。	
85%加保利 可濕性粉劑* (Carbaryl)	0.5-0.7 公斤	1,700		
3%加保扶粒劑* (Carbofuran)	40-60 公斤			
5%丁基加保扶 粒劑* (Carbosulfan)	40公斤			收割前29天停止施藥。
1.5%加保利粉劑* (Carbaryl)	40-50 公斤			
37%繁米松溶液* (Vamidothion)	1.2-1.5 公升			
1%免敵克粉劑* (Bendiocarb)	80公斤			收割前15天停止施藥。
40%免敵克 可濕性粉劑* (Bendiocarb)	1-1.2公斤	1,000		收割前15天停止施藥。
20%免扶克乳劑* (Benfuracarb)	2.0-2.4 公升	500	分藥期每隔7至10天施藥一次。	收割前37天停止施藥。

\*延伸使用藥劑