

十五、甜菜夜蛾

學名：*Spodoptera exigua* Hubner

英名：Beet army worm

危害作物：

玉米、高粱、番茄、蘆筍、落花生、棉、蒜、菊花、甘藍、花椰菜、四季豆...等四十餘種。

防治方法：

| 藥劑名稱 | 每公頃每次施藥量 | 稀釋倍數(倍) | 施藥方法 | 注意事項 |
|---|----------|---------|--|---|
| 80.2%甜菜夜蛾費洛蒙蒸散劑 (sex pheromones of <i>Spodoptera exigua</i>) | | | <ol style="list-style-type: none"> 1.每公頃設置點數11至18個，每個點前後距離約30公尺，左右距離約15公尺。 2.誘餌以”S”型固定於誘蟲盒內，每月更新一次。 3.誘蟲盒懸掛高度離地面1至1.5公尺處，或於作物生長點上方50至60公分處。 4.誘蟲盒以中改式誘蟲盒；制式誘蟲盒或利用廢棄保特瓶自行加開誘蟲口。 | <ol style="list-style-type: none"> 1.本性費洛蒙引誘劑是以塑膠微管為載體，每支誘餌內裝劑量為5mg。 2.使用前將性費洛蒙微管一端剪開，再行固定於誘蟲盒內。 3.不宜同時將兩種不同性費蒙置於同一個誘蟲盒內。 4.誘蟲盒誘得昆蟲後，底部之塑膠袋須最少每周清除或更新一次。 5.溫度低於攝氏15°C以下或雨季連續下雨時，因蟲口數降低，暫緩施設。 |

TAC