

### 三、樹薯葉蟎類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2%阿巴汀乳劑* (Abamectin)	0.5-2 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
2%阿巴汀 水基乳劑* (Abamectin)	0.5-2 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
2.5%賽洛寧 微乳劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.5-2 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著液* (lambda- Cyhalothrin)	0.5-2 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.5-2 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.5-2 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。

\*延伸使用藥劑