

八、山 藥 夜 蛾 類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
40%納乃得 水溶性粒劑* (Methomyl)	0.7-1 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
25%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	1.3-1.9 公斤	800	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.7-1 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑- 水溶性袋裝* (Methomyl)	0.7-1 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
5%可芬諾 水懸劑* (Chromafenozide)	1-1.5 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前18天停止施藥。
50%培丹 水溶性粉劑* (Cartap)	1-1.5 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
25%二福隆 可濕性粉劑* (Diflubenzuron)	0.5-0.8 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前35天停止施藥。
20%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.3-0.5 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
20%芬化利 可濕性粉劑* (Fenvalerate)	0.3-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
5%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	1.3-2 公升	750	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著液* (lambda- Cyhalothrin)	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda- Cyhalothrin)	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.8%賽洛寧水懸劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。

*延伸使用藥劑