

十五、山藥葉蟎類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
20%畢達本可濕性粉劑 (Pyridaben)	0.33-0.5 公斤	3,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
20%畢達本水懸劑 (Pyridaben)	0.33-0.5 公升	3,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
2%阿巴汀乳劑* (Abamectin)	0.5-2 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
2%阿巴汀水基乳劑* (Abamectin)	0.5-2 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-2 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
2.46%賽洛寧膠囊懸著液* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-2 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-2 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-2 公升	1,000	害蟎發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。

*延伸使用藥劑