

九、玉米蚜蟲類

學名：*Rhopalosiphum maidis* (Fitch)

英名：Corn leaf aphid

危害作物：玉米、高粱、大麥等。

生活習性：

周年發生，以每年之晚秋至翌年之早春為發生盛期。成蟲及若蟲較喜歡群聚在幼株之心葉之葉背或成株之苞葉、雄花及雄花梗等處吸汁危害。被害處有黏性之分泌物及若蟲白色之蛻皮。

危害特徵：被害植株常導致發育不良及花梗枯萎，致無花粉產生，影響果穗稔實。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
25%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.8-1.5 公斤	1,000	生育初期如發生蚜蟲平均每株100隻時即行噴藥。每隔10天噴藥一次，計二至三次。	
40%納乃得 水溶性粒劑* (Methomyl)	0.5-0.9 公斤	1,700	生育初期如發生蚜蟲平均每株100隻時即行噴藥。每隔10天噴藥一次，計二至三次。	
40%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.5-0.9 公斤	1,700	生育初期如發生蚜蟲平均每株100隻時即行噴藥。每隔10天噴藥一次，計二至三次。	
40%納乃得 水溶性粉劑- 水溶性袋裝* (Methomyl)	0.5-0.9 公斤	1,700	生育初期如發生蚜蟲平均每株100隻時即行噴藥。每隔10天噴藥一次，計二至三次。	

*延伸使用藥劑