

二、豆科作物疫病

學名：*Phytophthora spp.*

英名：Phytophthora blight

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
63.02%鹼性氯氧化銅水分散性粒劑* (Copper oxychloride)	1.3-2 公斤	400	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	避免與石灰硫黃、礦物油及有機砷混合使用。
70%鹼性氯氧化銅可濕性粉劑* (Copper oxychloride)	1.3-2 公斤	400	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	避免與石灰硫黃、礦物油及有機砷混合使用。
75%鹼性氯氧化銅可濕性粉劑* (Copper oxychloride)	1-1.6公斤	500	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	避免與石灰硫黃、礦物油及有機砷混合使用。
85%鹼性氯氧化銅可濕性粉劑* (Copper oxychloride)	1-1.6公斤	500	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	避免與石灰硫黃、礦物油及有機砷混合使用。
23%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	0.5-0.8 公升	1,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	豆菜類採收前14天、乾豆類採收前7天、豆苗採收前10天、豆薯採收前7天停止施藥。

*延伸使用藥劑