

## 六、豆科作物炭疽病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
75%四氯異苯腈可濕性粉劑* (Chlorothalonil)	0.8-1.3 公斤	600	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.豆菜類採收前6天停止施藥。 2.乾豆類採收前7天停止施藥。 3.小葉菜類採收前12天停止施藥。 4.根菜類採收前7天停止施藥。
75%四氯異苯腈水分散性粒劑* (Chlorothalonil)	0.8-1.3 公斤	600	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.豆菜類採收前6天停止施藥。 2.乾豆類採收前7天停止施藥。 3.小葉菜類採收前12天停止施藥。 4.根菜類採收前7天停止施藥。
40%四氯異苯腈水懸劑* (Chlorothalonil)	1.7-2.7 公升	300	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.豆菜類採收前6天停止施藥。 2.乾豆類採收前7天停止施藥。 3.小葉菜類採收前12天停止施藥。 4.根菜類採收前7天停止施藥。
23.6%百克敏乳劑* (Pyraclostrobin)	0.08-0.5 公升	3,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.小葉菜類採收前9天停止施藥。 2.根菜類、豆菜類採收前7天停止施藥。 3.乾豆類採收前21天停止施藥。

\*延伸使用藥劑