

## 二十八、豆 薯 炭 疽 病

藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施 藥 方 法	注 意 事 項
47.5%鋅錳乃浦 水分散性油懸劑* (Mancozeb)	0.8-1.3 公升	600	發病初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
33%鋅錳乃浦 水懸劑* (Mancozeb)	1.3-2 公升	400	發病初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
80%鋅錳乃浦 可濕性粉劑* (Mancozeb)	0.5-0.8 公斤	1,000	發病初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
17.8%貝芬待克利 水懸劑* (Carbendazim + Difenoconazole)	0.5-0.8 公升	1,000	發病初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
325g/L(32.5%w/v) 亞托待克利水懸劑* (Azoxystrobin + Difenoconazole)	0.3-0.4 公升	2,000	發病初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
24.9%待克利乳劑* (Difenoconazole)	0.2-0.3 公升	3,000	發病初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
24.9%待克利 水懸劑* (Difenoconazole)	0.2-0.3 公升	3,000	發病初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
250g/L(25%w/v) 待克利乳劑* (Difenoconazole)	0.2-0.3 公升	3,000	發病初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
10%待克利 水分散性粒劑* (Difenoconazole)	0.6-1 公斤	800	發病初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。

\*延伸使用藥劑