

二十九、豆 薯 白 粉 病

藥 劑 名 稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施 藥 方 法	注 意 事 項
50%白克列 水分散性粒劑* (Boscalid)	0.2-0.3 公斤	2,500	發病初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
50%撲滅寧 可濕性粉劑* (Procymidone)	0.4-0.7 公斤	1,200	發病初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
24.9%待克利乳劑* (Difenoconazole)	0.2-0.3 公升	3,000	發病初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
24.9%待克利 水懸劑* (Difenoconazole)	0.2-0.3 公升	3,000	發病初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
250g/L(25%w/v) 待克利乳劑* (Difenoconazole)	0.2-0.3 公升	3,000	發病初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
10%待克利 水分散性粒劑* (Difenoconazole)	0.4-0.7 公斤	1,200	發病初期開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。

*延伸使用藥劑