

### 三十、豆薯炭疽病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
47.5%鋅錳乃浦水分散性油懸劑* (Mancozeb)	0.8-1.3 公升	600	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
33%鋅錳乃浦水懸劑* (Mancozeb)	1.3-2 公升	400	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
80%鋅錳乃浦可濕性粉劑* (Mancozeb)	0.5-0.8 公斤	1,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。
17.8%貝芬待克利水懸劑* (Carbendazim + Difenoconazole)	0.5-0.8 公升	1,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
325g/L(32.5%w/v)亞托待克利水懸劑* (Azoxystrobin + Difenoconazole)	0.3-0.4 公升	2,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
24.9%待克利乳劑* (Difenoconazole)	0.2-0.3 公升	3,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
24.9%待克利水懸劑* (Difenoconazole)	0.2-0.3 公升	3,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
250g/L(25%w/v)待克利乳劑* (Difenoconazole)	0.2-0.3 公升	3,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
10%待克利水分散性粒劑* (Difenoconazole)	0.6-1 公斤	800	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。

\*延伸使用藥劑

