

三十一、豆科乾豆類白粉病

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
500g/L 氟殺克敏水懸劑* (Fluxapyroxad + Pyraclostrobin)	0.1-0.2 公升	5,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施用一次。	採收前21天停止施藥。
84.2%三得芬乳劑* (Tridemorph)	0.3-0.4 公升	3,500	發病初期開始施藥，必要時隔7天再施藥一次。	採收前9天停止施藥。
99%礦物油乳劑* (Petroleum oil)	2-2.5 公升	500	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續二次。	藥液噴施時，必須均勻覆蓋葉面、葉背及植珠。
5%菲克利水懸劑* (Hexaconazole)	0.3-0.4 公升	2,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.紅豆除外。 2.採收前7天停止用藥。
50% (1x10 ⁹ cfu/g) 枯草桿菌可濕性粉劑* (Bacillus subtilis)	1-1.5 公斤	800	發病初期開始施藥，以後隔7天施藥一次，連續四次。	避免與銅劑或抗生素混合使用。

*延伸使用藥劑