

三十五、豆科乾豆類炭疽病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
47.5%鋅錳乃浦水分散性油懸劑* (Mancozeb)	0.8-1.3 公升	600	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
33%鋅錳乃浦水懸劑* (Mancozeb)	1.3-2 公升	400	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
80%鋅錳乃浦可濕性粉劑* (Mancozeb)	0.5-0.8 公斤	1,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
27.3%三氟得克利水懸劑* (Trifloxystrobin + Tebuconazole)	0.2-0.3 公升	2,500	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.紅豆除外。 2.採收前7天停止施藥。
560g/L(56%w/v)四氯托敏水懸劑* (Azoxystrobin + Chlorothalonil)	0.5-0.8 公升	1,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
40%四氯異苯腈水懸劑* (Chlorothalonil)	1.7-2 公升	300	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
75%四氯異苯腈水分散性粒劑* (Chlorothalonil)	0.8-1 公斤	600	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
75%四氯異苯腈可濕性粉劑* (Chlorothalonil)	0.8-1 公斤	600	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。

*延伸使用藥劑