

## 六、豆科作物夜蛾類、毒蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
33%佈飛百滅寧乳劑* (Profenofos + Permethrin)	0.8-1 公升	1,000	害蟲發生時，開始施藥，每隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前7天，豆菜類及乾豆類採收前10天，根菜類採收前12天停止施藥。
18.4%剋安勃水懸劑* (Chlorantraniliprole)	0.2-0.3 公升	2,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本藥劑僅防治夜蛾類。</li> <li>2.小葉菜類採收前9天停止施藥。</li> <li>3.豆菜類採收前6天停止施藥。</li> <li>4.根菜類採收前14天停止施藥。</li> <li>5.乾豆類採收前21天停止施藥。</li> </ol>
35%剋安勃水分散性粒劑* (Chlorantraniliprole)	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本藥劑僅防治夜蛾類。</li> <li>2.小葉菜類採收前9天停止施藥。</li> <li>3.豆菜類採收前6天停止施藥。</li> <li>4.根菜類採收前14天停止施藥。</li> <li>5.乾豆類採收前21天停止施藥。</li> </ol>
43%佈飛松乳劑* (Profenofos)	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.本藥劑僅防治夜蛾類。</li> <li>2.乾豆類採收前10天停止施藥。</li> <li>3.豆菜類採收前10天停止施藥。</li> <li>4.根菜類採收前12天停止施藥。</li> <li>5.避免與石灰硫磺劑混合使用。</li> </ol>

\*延伸使用藥劑