

十九、豆科豆菜類夜蛾類

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
18.4%剋安勃 水懸劑 (Chlorantraniliprole)	0.2-0.3 公升	2,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
35%剋安勃 水分散性粒劑 (Chlorantraniliprole)	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
25%二福隆 可濕性粉劑* (Diflubenzuron)	0.4-0.6 公斤	1,500	害蟲發生時每 7 天施一 次。	1.採收前21天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，避免於 開花時使用。
58%乃力松乳劑* (Naled)	0.5-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
11.7%賜諾特 水懸劑* (Spinetoram)	0.4-0.7 公升	1,200	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前7天停止施藥。 2.對蜜蜂毒性高，避免開 花期使用。
5.87%賜諾特 水懸劑* (Spinetoram)	0.8-1.4 公升	600	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前7天停止施藥。 2.對蜜蜂毒性高，避免開 花期使用。
10%賽滅寧 可濕性粉劑* (Cypermethrin)	0.2-0.3 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧 可濕性粉劑* (Cypermethrin)	0.3-0.5 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧 水基乳劑* (Cypermethrin)	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧微乳劑* (Cypermethrin)	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧乳劑* (Cypermethrin)	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前9天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%因滅汀 水溶性粒劑* (Emamectin benzoate)	0.1-0.2 公斤	3,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
2.15%因滅汀乳劑* (Emamectin benzoate)	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
2.15%因滅汀 水基乳劑* (Emamectin benzoate)	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
5%因滅汀乳劑 (Emamectin benzoate)	0.1-0.2 公升	5,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
10%克凡派水懸劑* (Chlorfenapyr)	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.毛豆除外。 2.採收前18天停止施藥。
44.9%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos)	0.5-0.8 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前16天停止施藥。
300g/L賽速安勃水懸劑* (Thiamethoxam + Chlorantraniliprole)	0.1-0.2 公升	4,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
40%賽速安勃水分散性粒劑* (Thiamethoxam + Chlorantraniliprole)	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
2.46%賽洛寧膠囊懸著液* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.豆莢採收前3天停止施藥。 2.豆苗採收前9天停止施藥。
2.5%賽洛寧微乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.豆莢採收前3天停止施藥。 2.豆苗採收前9天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.豆莢採收前3天停止施藥。 2.豆苗採收前9天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.豆莢採收前3天停止施藥。 2.豆苗採收前9天停止施藥。
50%馬拉松乳劑* (Malathion)	1.0-1.2 公升	500	害蟲發生時開始施藥，每隔5至7天施藥一次。	1.採收前4天停止施藥。 2.不可與鹼性藥劑混用。 3.溫室栽培應避免使用。

*延伸使用藥劑