

二十六、豌豆花部薊馬類

臺灣花薊馬

學名：*Frankliniella intonsa* (Trybom)

英名：Eastern flower thrips

生活習性：

年發生二十二世代，寄主極廣，通常棲息於豌豆之心葉，花蕾及豆莢之萼片危害，豌豆自播種後二十天至採收完畢皆可發現成蟲及若蟲為害，蛹棲息於土中，羽化後之雌蟲，在其附近的豌豆心葉或花蕾產卵，卵期一至二天，甫孵化之若蟲至化蛹前，常移至嫩葉、花瓣及豆莢之萼片內銼吸組織內之汁液，本蟲終年可見，但在乾旱季節發生密度較高。

危害特徵：

被害的心葉皺縮捲曲，無法展開，豆莢則彎曲、萼片成灰白色，影響豌豆生育、產量及商品價值至鉅。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.5%賽洛寧微乳劑 (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	1,000	薊馬發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.防治臺灣花薊馬。 2.豆莢採收前3天停止用藥。 3.豆苗採收前9天停止用藥。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著液 (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	1,000	薊馬發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.防治臺灣花薊馬。 2.豆莢採收前3天停止用藥。 3.豆苗採收前9天停止用藥。
2.8%賽洛寧乳劑 (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	1,000	薊馬發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.防治臺灣花薊馬。 2.豆莢採收前3天停止用藥。 3.豆苗採收前9天停止用藥。
2.8%賽洛寧水懸劑 (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1 公升	1,000	薊馬發生時開始施藥，每隔7天施藥一次。	1.防治臺灣花薊馬。 2.豆莢採收前3天停止用藥。 3.豆苗採收前9天停止用藥。
2.5%賽洛寧微乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-8 公升	1,000	薊馬發生時開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著液* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-8 公升	1,000	薊馬發生時開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-8 公升	1,000	薊馬發生時開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.8%賽洛寧水懸劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-8 公升	1,000	薊馬發生時開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。

*延伸使用藥劑