

三十二、豆科根菜類夜蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
18.4%剋安勃水懸劑 (Chlorantraniliprole)	0.2-0.3 公升	2,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
35%剋安勃水分散性粒劑 (Chlorantraniliprole)	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
25%二福隆可濕性粉劑* (Diflubenzuron)	0.4-0.6 公升	1,500	害蟲發生時每7天施一次。	1.採收前35天停止施藥。 2.毒性請參考農藥標示。
58%乃力松乳劑* (Naled)	0.5-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
11.7%賜諾特水懸劑* (Spinetoram)	0.4-0.7 公升	1,200	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前7天停止施藥。 2.對蜜蜂毒性高，避免開花期使用。
5.87%賜諾特水懸劑* (Spinetoram)	0.8-1.4 公升	600	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前7天停止施藥。 2.對蜜蜂毒性高，避免開花期使用。
19.7%得芬諾水懸劑* (Tebufenozide)	0.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天再施藥一次。	採收前14天停止施藥。
70%得芬諾可濕性粉劑* (Tebufenozide)	0.33公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天再施藥一次。	採收前14天停止施藥。
10%賽滅寧可濕性粉劑* (Cypermethrin)	0.2-0.3 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧可濕性粉劑* (Cypermethrin)	0.3-0.5 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧水基乳劑* (Cypermethrin)	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧微乳劑* (Cypermethrin)	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%賽滅寧乳劑* (Cypermethrin)	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁用。
5%因滅汀水溶性粒劑* (Emamectin benzoate)	0.1-0.2 公斤	3,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.15%因滅汀乳劑* (Emamectin benzoate)	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
2.15%因滅汀水基乳劑* (Emamectin benzoate)	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
5%因滅汀乳劑* (Emamectin benzoate)	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。

*延伸使用藥劑