

#### 四十四、豆科乾豆類夜蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
18.4%剋安勃 水懸劑 (Chlorantraniliprole)	0.2-0.3 公升	2,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
35%剋安勃 水分散性粒劑 (Chlorantraniliprole)	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
5%因滅汀 水溶性粒劑* (Emamectin benzoate)	0.1-0.2 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止用藥。
5%因滅汀乳劑* (Emamectin benzoate)	0.1-0.2 公升	5,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止用藥。
2.15%因滅汀乳劑* (Emamectin benzoate)	0.3-0.4 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止用藥。
2.15%因滅汀 水基乳劑* (Emamectin benzoate)	0.3-0.4 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止用藥。
19.2g/L因滅汀 乳劑* (Emamectin benzoate)	0.3-0.4 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止用藥。
19.7%得芬諾 水懸劑* (Tebufenozide)	0.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天再施藥一次。	採收前7天停止施藥。
70%得芬諾 可濕性粉劑* (Tebufenozide)	0.33公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天再施藥一次。	採收前7天停止施藥。
10%賽滅寧 可濕性粉劑* (Cypermethrin)	0.2-0.3 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前30天停止施藥。
5%賽滅寧 可濕性粉劑* (Cypermethrin)	0.3-0.5 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前30天停止施藥。
5%賽滅寧 水基乳劑* (Cypermethrin)	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前30天停止施藥。
5%賽滅寧微乳劑* (Cypermethrin)	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前30天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
5%賽滅寧乳劑* (Cypermethrin)	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前30天停止施藥。

\*延伸使用藥劑