

## 四十七、大豆夜蛾類、螟蛾類、毒蛾類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
22.6%滅芬諾 水懸劑 (Methoxyfenozide)	0.5公升	2,000	幼蟲發生初期開始施藥，隔7天施藥一次，連續二次。	1.防治大豆夜蛾類。 2.採收前21天停止施藥。 3.使用本藥劑後不可與根菜類作物輪作，以免蓄積殘留。 4.具呼吸劇毒性。
5%因滅汀 水溶性粒劑* (Emamectin benzoate)	0.1-0.2 公斤	3,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.本藥劑僅防治夜蛾類。 2.採收前3天停止施藥。
2.15%因滅汀乳劑* (Emamectin benzoate)	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.本藥劑僅防治夜蛾類。 2.採收前3天停止施藥。
2.15%因滅汀 水基乳劑* (Emamectin benzoate)	0.3-0.5 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.本藥劑僅防治夜蛾類。 2.採收前3天停止施藥。
70%得芬諾 可濕性粉劑* (Tebufenozide)	0.2-0.3 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
19.7%得芬諾 水懸劑* (Tebufenozide)	0.3-0.4 公升	2,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。

\*延伸使用藥劑