

## 五十、落花生小綠葉蟬（落花生小綠浮塵子）

學名：*Edwardsiana flarescens* (Fabricius)

英名：Smaller green leafhopper

危害作物：落花生、苧麻、菜豆、蓖麻、桃、茶。

生活習性：

在臺南地區年發生十五世代，以8至11月發生密度最高，即秋作落花生被害較嚴重。

成蟲活躍，卵產於葉脈組織內，若、成蟲均在嫩芽或葉片吸汁危害。

危害特徵：被害葉片變黃皺縮，嚴重者自葉緣黃枯，影響落花生發育及產量。

防除方法：

| 藥劑名稱   | 每公頃每次施藥量 | 稀釋倍數(倍) | 施藥方法                                 | 注意事項       |
|--|----------|---------|--------------------------------------|------------|
| 45%硫敵芬化利<br>可濕性粉劑<br>(Thiodicarb +<br>Fenvalerate) | 0.67公斤   | 1,200   | 發生初期施藥一次，經<br>10天後，再施藥一次，<br>連續一至二次。 | 採收前7天停止施藥。 |
| 50%加保利<br>可濕性粉劑<br>(Carbaryl)                      | 2公斤      | 500     | 發生初期施藥一次，經<br>10天後，再施藥一次，<br>連續一至二次。 |            |
| 85%加保利<br>可濕性粉劑<br>(Carbaryl)                      | 1.2公斤    | 850     |                                      |            |