

六十九、葉用豌豆夜蛾類、螟蛾類、毒蛾類

| 藥劑名稱 | 每公頃每次施藥量 | 稀釋倍數(倍) | 施藥方法 | 注意事項 |
|---|-----------|---------|------------------------|--|
| 19.7%得芬諾水懸劑* (Tebufenozide) | 0.5公升 | 2,000 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天再施藥一次。 | 1.僅防治夜蛾類。 2.採收前7天停止施藥。 |
| 70%得芬諾可濕性粉劑* (Tebufenozide) | 0.33公斤 | 3,000 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天再施藥一次。 | 1.僅防治夜蛾類。 2.採收前7天停止施藥。 |
| 43%佈飛松乳劑* (Profenofos) | 0.5-0.8公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 1.僅防治夜蛾類。 2.採收前4天停止施藥。 3.避免與石灰硫磺劑混合使用。 |
| 5%因滅汀水溶性粒劑* (Emamectin benzoate) | 0.1-0.2公斤 | 3,500 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 1.僅防治夜蛾類。 2.採收前3天停止施藥。 |
| 2.15%因滅汀乳劑* (Emamectin benzoate) | 0.3-0.5公升 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 1.僅防治夜蛾類。 2.採收前3天停止施藥。 |
| 2.15%因滅汀水基乳劑* (Emamectin benzoate) | 0.3-0.5公升 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 1.僅防治夜蛾類。 2.採收前3天停止施藥。 |
| 40%賽速安勃水分散性劑* (Thiamethoxam + Chlorantraniliprole) | 0.1-0.2公斤 | 5,000 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。 |
| 300g/L 賽速安勃水懸劑* (Thiamethoxam + Chlorantraniliprole) | 0.1-0.2公升 | 4,000 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前9天停止施藥。 |
| 44.9%陶斯松乳劑* (Chlorpyrifos) | 0.5-0.8公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前10天停止施藥。 |
| 10%克凡派水懸劑* (Chlorfenapyr) | 0.5-0.8公升 | 1,000 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前10天停止施藥。 |

*延伸使用藥劑