

# 水稻蟲害

## 一、水稻稻蟲類、葉蟬類、椿象類、薊馬類

| 藥劑名稱                               | 每公頃每次施藥量      | 稀釋倍數(倍) | 施藥方法                   | 注意事項                          |
|------------------------------------|---------------|---------|------------------------|-------------------------------|
| 50%芬殺松乳劑<br>(Fenthion)             | 0.8-1.2<br>公升 | 1,000   | 害蟲發生時開始施藥。             | 1.收穫前21天停止施藥。<br>2.本藥劑僅防治薊馬類。 |
| 50%芬殺松<br>水基乳劑<br>(Fenthion)       | 0.8-1.2<br>公升 | 1,000   | 害蟲發生時開始施藥。             | 1.收穫前21天停止施藥。<br>2.本藥劑僅防治薊馬類。 |
| 25%賽速安<br>水溶性粒劑*<br>(Thiamethoxam) | 0.3公斤         | 1,600   | 害蟲發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前10天停止施藥。<br>2.本藥劑僅防治葉蟬類。 |
| 30%治滅蟲乳劑*<br>(Metolcarb)           | 1.2-1.5<br>公升 | 800     | 分藥期每隔7天施藥一次。           |                               |
| 50%治滅蟲<br>可濕性粉劑*<br>(Metolcarb)    | 0.5-0.6<br>公斤 | 2,000   | 分藥期每隔7天施藥一次。           |                               |
| 85%加保利<br>可濕性粉劑*<br>(Carbaryl)     | 0.5-0.7<br>公斤 | 1,700   |                        | 收割前21天停止施藥。                   |
| 3%加保扶粒劑*<br>(Carbofuran)           | 40-60<br>公斤   |         |                        |                               |
| 5%丁基加保扶<br>粒劑*<br>(Carbosulfan)    | 40公斤          |         |                        | 收割前29天停止施藥。                   |
| 37%繁米松溶液*<br>(Vamidotion)          | 1.2-1.5<br>公升 |         |                        |                               |
| 40%免敵克<br>可濕性粉劑*<br>(Bendiocarb)   | 1-1.2公斤       | 1,000   |                        | 收割前15天停止施藥。                   |
| 20%免扶克乳劑*<br>(Benfuracarb)         | 2.0-2.4<br>公升 | 500     | 分藥期每隔7至10天施藥一次。        | 收割前37天停止施藥。                   |

\*延伸使用藥劑