

二十一、稻象鼻蟲

學名：*Echinocnemus squameus* (Billberg)

英名：Rice plant weevil

生活習性：

年發生二世代，第一世代成蟲出現於六～七月，第二世代出現於十月左右。成蟲在雜草越冬。水稻移植後，至本田危害。成蟲多棲息於稻株基部，以口吻插入葉鞘或莖內取食，入土中危害稻根。並於土中化蛹。

危害特徵：

成蟲危害可引起稻株折斷或造成枯萎。幼蟲危害稻株萎縮，葉片黃化，終至枯死。

防除方法：幼蟲：插秧撒佈菸沙。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
5%免扶克粒劑* (Benfuracarb)	40公斤		害蟲發生時施藥一次。	1.施藥時稻田需保持水位1公分。 2.本藥劑僅在水稻生育初期使用，晚期不可施。 3.對水生物劇毒。
6%培丹粒劑* (Cartap hydrochloride)	30公斤		害蟲發生時施藥一次。	1.收割前21天停止施藥。 2.施藥時稻田需保持水位約1公分。 3.水稻生育初期，當水稻蟲害發生時施藥。 4.具皮膚刺激性，對蜜蜂具中等毒性，對魚劇毒。
3%加保扶粒劑* (Carbofuran)	60公斤		害蟲發生時施藥一次。	施藥時，稻田需保持水位約1公分。
3%丁基加保扶粒劑* (Carbosulfan)	60公斤		害蟲發生時施藥一次。	施藥時，稻田需保持水位約1公分。

*延伸使用藥劑