

二十三、稻 鐵 甲 蟲

學名：*Dicladispa armigera* (Olivier)

英名：Rice hispa

生活習性：

鐵甲蟲一年發生4~5個世代。成蟲多在水稻殘株、田邊雜草、茭白或甘蔗園內越冬。成蟲具假死習性，活動力不強，多在清晨或陰雨天取食，白天常棲於稻葉背面，遇到暴風雨時移棲稻株基部。

危害特徵：

成蟲以咀嚼式口器，自葉片表面沿葉脈啃食上表皮及葉綠層，遺留下表皮而呈現白色長條斑紋。幼蟲在葉片組織內，潛行取食危害，僅留上、下表皮，呈白色袋狀，危害嚴重時斑紋連成一片，全葉變白而枯黃，不能抽穗，甚至全株枯死。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
50%芬殺松乳劑 (Fenthion)	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	收穫前21天停止施藥。
50%芬殺松 水基乳劑 (Fenthion)	0.8-1.2 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥。	收穫前21天停止施藥。
5%免扶克粒劑* (Benfuracarb)	40公斤		害蟲發生時施藥一次。	1.施藥時稻田需保持水位1公分。 2.本藥劑僅在水稻生育初期使用，晚期不可施。 3.對水生物劇毒。
6%培丹粒劑* (Cartap hydrochloride)	30公斤		害蟲發生時施藥一次。	1.收割前21天停止施藥。 2.施藥時稻田需保持水位約1公分。 3.水稻生育初期，當水稻蟲害發生時施藥。 4.具皮膚刺激性，對蜜蜂具中等毒性，對魚劇毒。
3%加保扶粒劑* (Carbofuran)	60公斤		害蟲發生時施藥一次。	施藥時，稻田需保持水位約1公分。
3%丁基加保扶 粒劑* (Carbosulfan)	60公斤		害蟲發生時施藥一次。	施藥時，稻田需保持水位約1公分。

*延伸使用藥劑