

十一、旋花科根菜類夜蛾類

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
18.4%剋安勃 水懸劑 (Chlorantraniliprole)	0.1-0.6 公升	2,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
35%剋安勃 水分散性粒劑 (Chlorantraniliprole)	0.1-0.3 公斤	5,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
10%賽滅寧 可濕性粉劑 (Cypermethrin)	0.1-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁 用。
5%賽滅寧 可濕性粉劑 (Cypermethrin)	0.2-1 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁 用。
5%賽滅寧 水基乳劑 (Cypermethrin)	0.2-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁 用。
5%賽滅寧微乳劑 (Cypermethrin)	0.2-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁 用。
5%賽滅寧乳劑 (Cypermethrin)	0.2-1 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對蜜蜂具毒性，水域禁 用。
50%培丹 水溶性粉劑* (Cartap hydrochloride)	0.3-1.5 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
5%可芬諾水懸劑* (Chromafenazide)	0.3-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前18天停止施藥。
58%乃力松乳劑* (Naled)	0.5-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
25%二福隆 可濕性粉劑* (Diflubenzuron)	0.4-0.6 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前35天停止施藥。
33%佈飛百滅寧 乳劑* (Profenofos + Permethrin)	0.8-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必 要時隔7天施藥一次。	採收前12天停止施藥。

*延伸使用藥劑