

十三、旋花科根菜類金花蟲類

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
50%培丹 水溶性粉劑* (Cartap hydrochloride)	0.3-1.5 公斤	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
5%可芬諾水懸劑* (Chromafenazide)	0.3-1.5 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前18天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粒劑* (Methomyl)	0.2-1 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
25%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.3-1.9 公斤	800	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑* (Methomyl)	0.2-1 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
40%納乃得 水溶性粉劑- 水溶性袋裝* (Methomyl)	0.2-1 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
25%二福隆 可濕性粉劑* (Diflubenzuron)	0.4-0.6 公斤	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前35天停止施藥。
10%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.2-0.7 公升	1,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
20%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
20%芬化利 水基乳劑* (Fenvalerate)	0.1-0.3 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
20%芬化利 可濕性粉劑* (Fenvalerate)	0.1-0.3 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
5%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.3-2.0 公升	750	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
34%硫敵克水懸劑* (Thiodicarb)	0.3-1 公升	1,000	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
75%硫敵克 可濕性粉劑* (Thiodicarb)	0.1-0.4 公斤	2,500	害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

*延伸使用藥劑