

## 二十一、甘藷蟻象、猿葉蟲

### 甘藷蟻象

學名：*Cylas formicarius* (Fabricius)

英名：Sweet Potato weevil

危害作物：甘藷、牽牛花、甕菜。

生活習性：

年發生七至八世代，以8至1間發生密度最高。成蟲多棲息於葉蔓間，嚙食塊根或葉柄，具假死習性。卵產於主蔓基部或塊根表皮內，老熟幼蟲在危害部化蛹。

危害特徵：幼蟲蛀食於地下莖或塊根，被害部呈褐色，木質化，具惡臭，不能供食。

### 甘藷猿葉蟲

學名：*Colasposoma auripenne* Motschulsky

英名：Sweet potato leaf beetle

危害作物：甘藷、棉。

生活習性：

年發生二至三世代，以幼蟲越冬。成蟲嚙食葉片成不整形孔，於3至4月及7至8月出現最多。卵產於土表，老熟幼蟲在土中造窩化蛹。

危害特徵：幼蟲潛入土中嚙食塊根表皮，形成不規則凹道，影響商品價值。

防除方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
2.5%陶斯松粉劑 (Chlorpyrifos)	45公斤		將藥劑施於蔓葉間以毒殺成蟲，每7至10天施用一次，連續三至四次。	