

## 二十六、葉用甘藷夜蛾類、烏羽蛾類、天蛾類

夜蛾類：包括斜紋夜蛾、甜菜夜蛾、番茄夜蛾、擬尺蠖等害蟲。

烏羽蛾類：包括甘藷烏羽蛾、白烏羽蛾等害蟲。

天蛾類：包括蝦殼天蛾、條紋天蛾等害蟲。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
25%汰芬隆 水懸劑* (Diafenthiuron)	1-1.5 公升	750	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	1.採收前14天停止施藥。 2.高溫多濕條件下可能發生藥害，避免在溫室設施、隧道栽培時使用
20%芬化利 水基乳劑* (Fenvalerate)	0.15-0.25 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
20%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.15-0.25 公升	3,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
20%芬化利 可濕性粉劑* (Fenvalerate)		5,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7至10天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
5%芬化利乳劑* (Fenvalerate)	0.5公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
2.46%賽洛寧 膠囊懸著液* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.5%賽洛寧 微乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.8%賽洛寧乳劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
2.8%賽洛寧 水懸劑* (lambda-Cyhalothrin)	0.5-1公升	2,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	採收前9天停止施藥。
50%馬拉松乳劑* (Malathion)	1.0-1.2 公升	500	害蟲發生時開始施藥， 每隔5至7天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
35%白克松 可濕性粉劑* (Pyraclofos)	0.25-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	採收前15天停止施藥。
75%硫敵克 可濕性粉劑* (Thiodicarb)	0.3-0.5 公斤	3,000	害蟲發生時開始施藥， 每隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.避免與石灰硫磺合劑、波爾多液、重金屬系藥劑混用。

\*延伸使用藥劑