

二、葫蘆科作物疫病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
1×10 ⁷ cfu/g 蓋棘木黴菌 可濕性粉劑 (<i>Trichoderma gamsii</i> ICC 080 + <i>Trichoderma asperellum</i> ICC 012)	2.5公斤	2,000	1.使用前24-36小時，先將本藥劑與水以1:10比例混合泡製，且不定時攪動溶液，促進分生孢子發芽，施藥前再以足夠之水量稀釋至2,000倍，每株澆灌200毫升。 2.定植前7天灌注植穴1次，定植當天再澆灌全株1次，共2次。	1.避免於高溫及強日照下施用本藥劑，配製之稀釋藥液應於當天用畢，避免與殺菌劑混合使用。 2.具呼吸中等毒。
35%依得利 可濕性粉劑* (Etridiazole)	0.4-1.0 公斤	2,000	1.苗期於病株周圍每株灌藥液500毫升。 2.病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
25%依得利乳劑* (Etridiazole)	0.5-1.3 公升	1,500	1.苗期於病株周圍每株灌藥液500毫升。 2.病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
60%免得克敏 水分散性粒劑* (Metiram + Pyraclostrobin)	0.375-1 公斤	800	病害發生初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續三次。	小葉菜類採收前6天、瓜果類及瓜菜類採收前9天停止施藥。

*延伸使用藥劑