

十五、葫蘆科瓜菜類疫病

學名：*Phytophthora melongenae* Sawada；*Phytophthora* sp.

英名：Phytophthora rot

病徵及傳播途徑：請參閱瓜類疫病。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
9.4%賽座滅水懸劑* (Cyazofamid)	0.3-0.5公升	3,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
2.5%右滅達樂粒劑* (Metalaxyl-M)	20公斤 (定植前) 40公斤 (定植後21天)		播種前或定植前於植穴周圍均勻施藥，每平方公尺2公克。 瓜苗定植後21天，於根圍附近再施藥一次，每平方公尺4公克。	限苗期使用。
50%達滅芬可濕性粉劑* (Dimethomorph)	4公斤	3,000	發病初期開始施藥，每株灌藥500公撮於病株周圍，每隔7天灌注一次，連續3次。	採收前6天停止施藥。
50%達滅芬水懸劑* (Dimethomorph)	4公斤	3,000	發病初期開始施藥，每株灌藥500公撮於病株周圍，每隔7天灌注一次，連續3次。	採收前6天停止施藥。

*延伸使用藥劑