

## 十六、葫蘆科瓜菜類白粉病

學名：*Sphaerotheca fusca*；*Erysiphe cichoracearum*

英名：Powdery mildew

病徵及傳播途徑：請參閱瓜類白粉病。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
11.6%四克利水基乳劑 (Tetraconazole)	0.7-1公升	1,500	病害發生初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
10.7%四克利乳劑 (Tetraconazole)	0.7-1公升	1,500	病害發生初期開始施藥，以後每隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.對水生物具毒性，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區」。
500g/L氟殺克敏(50%w/v)水懸劑 (Fluxapyroxad + Pyraclostrobin)	0.15公升	5,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施用一次。	採收前5天停止施藥。
125g/L亞派占乳劑 (Isopyrazam)	0.2-1公升	2,000	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
99%礦物油乳劑* (Petroleum oil)	2-2.5公升	500	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續2次。	藥液噴施時，必須均勻覆蓋葉面、葉背及植珠。
50%白克列水分散性粒劑* (Boscalid)	0.5公斤	2,500	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續3次。	採收前6天停止施藥。
80%碳酸氫鉀水溶性粉劑* (Potassium hydrogen carbonate)	1-1.2公斤	1,000	發病初期開始施藥，每隔5天施藥一次，連續3次。	具中度眼刺激性及中度皮膚刺激性。
30%賽福座可濕性粉劑* (Triflumizole)	0.3-0.5公斤	3,000	發病初期開始施藥，每隔7至10天施藥一次，連續3次。	1.本藥劑試驗時加展著劑 Rabiden-SS 3,000倍。 2.採收前3天停止施藥。
84.2%三得芬乳劑* (Tridemorph)	0.3-0.4公升	3,500	發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次，連續3次。	1.本藥劑試驗時加展著劑「全透力」1,000倍。 2.採收前9天停止用藥。
25%螞離丹可濕性粉劑* (Chinomethionat)	1-1.25公斤	1,000	發病初期開始施藥，每隔8至10天施藥一次，連續3至4次。	1.藥液應噴於葉片上下兩面。 2.採收前7天停止施藥。
25%依瑞莫水懸劑* (Ethirimol)	0.7公升	1,500	發病初期開始施藥，每隔8至10天施藥一次，連續3至4次。	1.藥液應噴於葉片上下兩面。 2.採收前7天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
25%布瑞莫乳劑* (Bupirimate)	0.35公升	3,000	發病初期開始施藥，每 隔8至10天施藥一次，連 續3至4次。	1.藥液應噴於葉片上下兩 面。 2.採收前3天停止施藥。
250g/L布瑞莫乳劑* (Bupirimate)	0.35公升	3,000	發病初期開始施藥，每 隔8至10天施藥一次，連 續3至4次。	1.藥液應噴於葉片上下兩 面。 2.採收前3天停止施藥。
11.76%芬瑞莫 乳劑* (Fenarimol)	0.1-0.15 公升	10,000	發病初期開始施藥，每 隔10天施藥一次，連續 3次。	1.噴藥時加展著劑「來著 通」2,000倍。 2.採收前3天停止施藥。

\*延伸使用藥劑