

十六、葫蘆科瓜菜類白粉病

學名：*Sphaerotheca fusca*；*Erysiphe cichoracearum*

英名：Powdery mildew

病徵及傳播途徑：請參閱瓜類白粉病。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
500g/L 氟殺克敏 (50%w/v) 水懸劑 (Fluxapyroxad + Pyraclostrobin)	0.15 公升	5,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施用一次。	採收前5天停止施藥。
125g/L 亞派占乳劑 (Isopyrazam)	0.2-1 公升	2,000	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次。	採收前3天停止施藥。
99% 礦物油乳劑* (Petroleum oil)	2-2.5 公升	500	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續2次。	藥液噴施時，必須均勻覆蓋葉面、葉背及植珠。
50% 白克列水分散性粒劑* (Boscalid)	0.5 公斤	2,500	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續3次。	採收前6天停止施藥。
80% 碳酸氫鉀水溶性粉劑* (Potassium hydrogen carbonate)	1-1.2 公斤	1,000	發病初期開始施藥，每隔5天施藥一次，連續3次。	具中度眼刺激性及中度皮膚刺激性。
30% 賽福座可濕性粉劑* (Triflumizole)	0.3-0.5 公斤	3,000	發病初期開始施藥，每隔7至10天施藥一次，連續3次。	1. 本藥劑試驗時加展著劑 Rabiden-SS 3,000倍。 2. 採收前3天停止施藥。
84.2% 三得芬乳劑* (Tridemorph)	0.3-0.4 公升	3,500	發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次，連續3次。	1. 本藥劑試驗時加展著劑「全透力」1,000倍。 2. 採收前9天停止用藥。
25% 螞離丹可濕性粉劑* (Chinomethionat)	1-1.25 公斤	1,000	發病初期開始施藥，每隔8至10天施藥一次，連續3至4次。	1. 藥液應噴於葉片上下兩面。 2. 採收前7天停止施藥。
25% 依瑞莫水懸劑* (Ethirimol)	0.7 公升	1,500	發病初期開始施藥，每隔8至10天施藥一次，連續3至4次。	1. 藥液應噴於葉片上下兩面。 2. 採收前7天停止施藥。
25% 布瑞莫乳劑* (Bupirimate)	0.35 公升	3,000	發病初期開始施藥，每隔8至10天施藥一次，連續3至4次。	1. 藥液應噴於葉片上下兩面。 2. 採收前3天停止施藥。
250g/L 布瑞莫乳劑* (Bupirimate)	0.35 公升	3,000	發病初期開始施藥，每隔8至10天施藥一次，連續3至4次。	1. 藥液應噴於葉片上下兩面。 2. 採收前3天停止施藥。
11.76% 芬瑞莫乳劑* (Fenarimol)	0.1-0.15 公升	10,000	發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次，連續3次。	1. 噴藥時加展著劑「來著通」2,000倍。 2. 採收前3天停止施藥。

*延伸使用藥劑

