

### 三十三、葫蘆科瓜果類根瘤線蟲

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
10%托福松粒劑 (Terbufos)	15公斤	200	1.種植當日將藥劑施於植穴內，覆土後定植。 2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用，生長期不可施用。 2.施藥時必須戴手套。
10%托福毆殺滅粒劑 (Oxamyl + Terbufos)	20公斤		1.種植當日將藥劑施於植溝內，覆土後定植。 2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用，生長期不可施用。 2.施藥時必須戴手套。
10%芬滅松粒劑 (Fenamiphos)	15公斤		1.種植當日將藥劑施於植溝內，覆土後定植。 2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用，生長期不可施用。 2.施藥時必須戴手套。
5%芬滅松粒劑 (Fenamiphos)	30公斤		1.種植當日將藥劑施於植溝內，覆土後定植。 2.土壤須保持濕潤才能發揮藥效。	1.限種植前使用，生長期不可施用。 2.施藥時必須戴手套。
10%普伏松粒劑 (Ethoprophos)	30公斤		種植當日將藥劑條施於植溝內，並覆土再種植。	移植當日施用於土壤。
15%福賽絕乳劑 (Fosthiazate)	10公升		種植當日將藥劑條施於植溝內，並覆土再種植。	1.限於移植當日施藥。 2.對水生物、鳥類、蜜蜂毒性強。
10%福賽絕粒劑 (Fosthiazate)	20公斤		種植當日將藥劑條施於植溝內，並覆土再種植。	1.限於移植當日施藥。 2.對水生物、鳥類、蜜蜂毒性強。