

## 十二、茄科果菜類白粉病

學名：*Erysiphe cichoracearum* DC.；*Leveillula taurica* Arnaud (有性世代)；  
*Oidiopsis sicula* (無性世代)

英名：Powdery mildew

病徵：

葉片被害初期呈現細小白粉狀斑點，病斑逐漸擴大，以致葉面覆蓋著一層白色粉末物，此即病原菌之分生孢子與菌絲，而後病斑漸變為灰色。

傳播途徑：本病係藉此白色粉狀物中之分生孢子傳播。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
500g/L 氟殺克敏水懸劑* (Fluxapyroxad + Pyraclostrobin)	0.1-0.3 公升	5,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施用一次。	採收前6天停止施藥。
50%白克列水分散性粒劑* (Boscalid)	0.2-0.6 公斤	2,500	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
42.4%白克列水懸劑* (Boscalid)	0.2-0.7 公升	2,100	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
99%礦物油乳劑* (Petroleum oil)	2-2.5 公升	500	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續二次。	藥液噴施時，必須均勻覆蓋葉面、葉背及植株。

\*延伸使用藥劑