

三十七、洛神葵疫病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
63.02%鹼性氯氧化銅水分散性粒劑* (Copperoxychloride)	1.5-3公斤	400	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	避免與石灰硫黃、礦物油及有機砷混合使用。
70%鹼性氯氧化銅可濕性粉劑* (Copperoxychloride)	1.5-3公斤	400	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	避免與石灰硫黃、礦物油及有機砷混合使用。
75%鹼性氯氧化銅可濕性粉劑* (Copperoxychloride)	1.2-2.4公斤	500	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	避免與石灰硫黃、礦物油及有機砷混合使用。
85%鹼性氯氧化銅可濕性粉劑* (Copperoxychloride)	1.2-2.4公斤	500	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	避免與石灰硫黃、礦物油及有機砷混合使用。
60%免得克敏水分散性粒劑* (Metiram + Pyraclostrobin)	0.7-1.3公斤	900	發病初期開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.具口服中等毒、嚴重皮膚刺激性。 3.對水生物劇毒、水域禁用及勿使用於「自來水水質水量保護區、飲用水水源水質保護區及飲用水取水口一定距離內之地區」。
525g/L達滅脫定水懸劑* (Ametoctradin + Dimethomorph)	0.6-1.2公升	1,000	發病初期開始施藥，必要時每隔7天施藥一次。	1.採收前6天停止施藥。 2.具口服中等毒。 3.對水生物具毒性，水域禁用及勿使用於「自來水水質水量保護區、飲用水水源水質保護區及飲用水取水口一定距離內之地區」。
60.8%氟比拔克水懸劑* (Fluopicolide + Propamocarb hydrochloride)	0.6-1.2公升	1,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.務必全株均勻噴施，包含莖基部。 2.採收前3天停止施藥。

*延伸使用藥劑