

六、十字花科蔬菜白銹病

藥劑名稱	每公頃每 次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
75%鋅錳座賽胺 水分散性粒劑* (Mancozeb + Zoxamide)	0.2-0.8 公斤	1,200	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1. 小葉菜類採收前9天、包葉菜類採收前21天、根莖菜類採收前12天停止施藥。 2. 避免與礦物油、石灰硫黃混合使用。 3. 避免於開花期或高溫多濕下使用。
50%達滅芬 可濕性粉劑* (Dimethomorph)	0.08-0.3 公斤	3,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前6天、包葉菜類採收前12天、根菜類採收前7天停止施藥。
50%達滅芬水懸劑* (Dimethomorph)	0.08-0.3 公升	3,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前6天、包葉菜類採收前12天、根菜類採收前7天停止施藥。
500g/L達滅芬 水懸劑* (Dimethomorph)	0.08-0.3 公升	3,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	小葉菜類採收前6天、包葉菜類採收前12天、根菜類採收前7天停止施藥。

*延伸使用藥劑