

六、十字花科蔬菜黑斑病

學名：*Alternaria brassicae* (BERK) Sacc.

英名：Alternaria leaf spot, Black leaf spot, Brown rot

病徵：

葉、莖、花梗、蒴果及種子皆可被害。被害部初生小點，擴大呈同心輪紋狀褐色斑點，老葉發生較多。

傳播途徑：依靠病斑上分生孢子傳播。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
10%保粒黴素(甲)可濕性粉劑* (Polyoxins)	0.3-1 公斤	1,000	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續三次。	具呼吸中等毒性。
21.2%依滅列乳劑* (Imazalil)	0.2-0.7 公升	1,500	發病初期開始施藥，每隔7天噴藥一次，連續三次。	採收前12天停止施藥。
75%四氯異苯腈可濕性粉劑* (Chlorothalonil)	0.4-1.4 公斤	700	發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次，連續三次至四次。	包葉菜類採收前21天停止施藥。小葉菜類採收前12天停止施藥。
75%四氯異苯腈水分散性粒劑* (Chlorothalonil)	0.4-1.4 公斤	700	發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次，連續三次至四次。	包葉菜類採收前21天停止施藥。小葉菜類採收前12天停止施藥。
40%四氯異苯腈水懸劑* (Chlorothalonil)	0.9-3.3 公升	300	發病初期開始施藥，每隔10天施藥一次，連續三次至四次。	包葉菜類採收前21天停止施藥。小葉菜類採收前7天停止施藥。

*延伸使用藥劑