

十九、白菜黑斑病

學名：*Alternaria brassicae* (Berk) Sacc.

英名：Alternaria leaf spot, Black leaf spot, Brown rot

病徵：

葉、莖、花梗、蒴果及種子皆可被害。被害部多呈現二~十公厘圓形，具鮮明同心圓輪狀褐色病斑。老葉發生較多。

傳播途徑：依靠病斑上分生孢子傳播。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
21.2%依滅列乳劑 (Imazalil)	0.7-1.0 公升	1,500	發病初期開始施藥，每隔7天噴藥一次，連續三次。	1.本藥劑試驗加展著劑 Nu Film，每1,000公斤藥液加0.5公升。 2.採收前6天停止施藥。
75%四氯異苯腈可濕性粉劑 (Chlorothalonil)	1.8-2.1 公斤	700	發病初期開始施藥，以後每隔10天施藥一次，連續三次至四次。	採收前7天停止施藥。
75%四氯異苯腈水分散性粒劑 (Chlorothalonil)	1.8-2.1 公斤	700	發病初期開始施藥，以後每隔10天施藥一次，連續三次至四次。	採收前7天停止施藥。
40%四氯異苯腈水懸劑* (Chlorothalonil)	4.2-4.9 公升	300	發病初期開始施藥，以後每隔10天施藥一次，連續三次至四次。	採收前7天停止施藥。

*延伸使用藥劑