

二十四、菊科葉菜類露菌病

英名：Downy mildew

病徵：

初期於葉表出現水浸狀淡黃色小斑點，病斑逐漸擴大並受限於葉脈，而形成不規則形之黃色角斑，溼度高或露水多時，於病斑之葉背長出白色黴狀物，最後病斑壞死呈褐色，病斑互相連結導致葉片枯黃。

傳播途徑：病斑上所生之孢子囊可藉空氣傳播。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
18.7%達滅克敏水分散性粒劑* (Pyraclostrobin + Dimethomorph)	0.2-0.7 公斤	1,500	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續三次。	1.採收前9天停止施藥。 2.具口服及呼吸中等毒性，中度眼刺激性。 3.對蜜蜂具劇毒性。
23%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	0.1-0.5 公升	2,000	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續三次。	1.採收前10天停止施藥。 2.具口服及呼吸中等毒性，中度眼刺激性。
71.6%銅右滅達樂可濕性粉劑* (Copper Oxychloride + Metalaxyl-M)	0.4-1.7 公斤	600	發病初期開始施藥，每隔7至10天施藥一次，連續三次。	採收前3天停止施藥。

*延伸使用藥劑