

四十五、艾草炭疽病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
27.3%三氟得克利水懸劑* (Trifloxystrobin + Tebuconazole)	0.1-0.4 公升	2,500	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
23.6%百克敏乳劑* (Pyraclostrobin)	0.08-0.5 公升	3,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
75%四氯異苯腈可濕性粉劑* (Chlorothalonil)	0.4-1.7 公斤	600	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
75%四氯異苯腈水分散性粒劑* (Chlorothalonil)	0.4-1.7 公斤	600	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
40%四氯異苯腈水懸劑* (Chlorothalonil)	0.8-3.1 公升	320	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
24.9%待克利乳劑* (Difenoconazole)	0.08-0.3 公升	3,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
24.9%待克利水懸劑* (Difenoconazole)	0.08-0.3 公升	3,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
250g/L待克利乳劑* (Difenoconazole)	0.08-0.3 公升	3,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。
10%待克利水分散性粒劑* (Difenoconazole)	0.2-0.8 公斤	1,200	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前21天停止施藥。

*延伸使用藥劑