

## 四十七、蔥科作物疫病

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
1×10 <sup>7</sup> cfu/g蓋棘木黴菌可濕性粉劑 ( <i>Trichoderma gamsii</i> ICC 080 + <i>Trichoderma asperellum</i> ICC 012)	2.5公斤	2,000	1.使用前24-36小時，先將本藥劑與水以1：10比例混合泡製，且不定時攪動溶液，促進分生孢子發芽，施藥前再以足夠之水量稀釋至2,000倍，每株澆灌200毫升。 2.定植前7天灌注植穴1次，定植當天再澆灌全株1次，共2次。	1.避免於高溫及強日照下施用本藥劑，配製之稀釋藥液應於當天用畢，避免與殺菌劑混合使用。 2.具呼吸中等毒。
60.8%氟比拔克水懸劑* (Fluopicolide + Propamocarb hydrochloride)	0.8-2公升	1,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1.務必全株均勻噴施，包含莖基部。 2.採收前21天(設施栽培28天)停止施藥。
23%亞托敏水懸劑* (Azoxystrobin)	0.8-2公升	1,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。

\*延伸使用藥劑