

八十七、旋花科作物白銹病（包含甘藷及旋花科小葉菜類）

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
50%達滅芬 可濕性粉劑* (Dimethomorph)	0.08-0.5 公斤	3,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1. 葉菜類採收前6天停止施藥。 2. 甘藷採收前7天停止施藥。
50%達滅芬 水懸劑* (Dimethomorph)	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1. 葉菜類採收前6天停止施藥。 2. 甘藷採收前7天停止施藥。
500g/L達滅芬 水懸劑* (Dimethomorph)	0.08-0.5 公升	3,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1. 葉菜類採收前6天停止施藥。 2. 甘藷採收前7天停止施藥。
71.6%銅右滅達樂 可濕性粉劑* (Copper oxychloride + Metalaxyl-M)	0.4-2.5 公斤	600	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	1. 採收前3天停止施藥。 2. 避免與石灰硫黃、礦物油混合使用，以免發生藥害。

*延伸使用藥劑