

十一、蔥科根菜類紫斑病

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數 (倍)	施藥方法	注意事項
10%保粒黴素(甲) 可濕性粉劑* (Polyoxins)	0.8-2 公斤	1,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	
50%保粒黴素(甲) 水溶性粒劑* (Polyoxins)	0.2-0.4 公斤	5,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	
50%(POLYOXIN-B 500,000AmBu/g) 保粒黴素(甲) 水溶性粒劑* (Polyoxins)	0.2-0.4 公斤	5,000	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	
44.2%克收欣 水懸劑* (Kresoxim-methyl)	0.3-0.8 公升	2,500	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
50%克收欣 水分散性粒劑* (Kresoxim-methyl)	0.3-0.7 公斤	2,800	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
45%甲鋅保粒素 可濕性粉劑* (Propineb + Polyoxins)	1.6-4 公斤	500	發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。

*延伸使用藥劑