

十二、蔥科根菜類銹病

| 藥劑名稱 | 每公頃每次施藥量 | 稀釋倍數(倍) | 施藥方法 | 注意事項 |
|--|---------------|---------|---------------------------|----------------------------------|
| 43.7%三氟敏水懸劑* (Trifloxystrobin) | 0.2-0.6 公升 | 3,500 | 病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前21天停止施藥。 2.抽苔後不得使用。 |
| 500g/L三氟敏(50%w/v)水懸劑* (Trifloxystrobin) | 0.2-0.5 公升 | 4,000 | 病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 1.採收前21天停止施藥。 2.抽苔後不得使用。 |
| 10%菲克利乳劑* (Hexaconazole) | 0.3-0.7 公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥，必要時隔7-10天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.不得用於韭黃、韭菜花及蒜苔。 |
| 10%菲克利水懸劑* (Hexaconazole) | 0.3-0.7 公升 | 3,000 | 病害發生初期開始施藥，必要時隔7-10天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.不得用於韭黃、韭菜花及蒜苔。 |
| 23%菲克利水懸劑* (Hexaconazole) | 0.1-0.3 公升 | 6,900 | 病害發生初期開始施藥，必要時隔7-10天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.不得用於韭黃、韭菜花及蒜苔。 |
| 5%菲克利水懸劑* (Hexaconazole) | 0.5-1.3 公升 | 1,500 | 病害發生初期開始施藥，必要時隔7-10天施藥一次。 | 1.採收前9天停止施藥。 2.不得用於韭黃、韭菜花及蒜苔。 |
| 28%亞托環克座水懸劑* (Cyproconazole + Azoxystrobin) | 0.3-0.7 公升 | 3,000 | 發病初期開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 採收前10天停止施藥。 |

*延伸使用藥劑