

## 三十、胡 蘿 蔔 白 粉 病

學名：*Erysiphe heraclei* DC.

英名：Powdery mildew

病徵：

主要發生於生育中後期，危害葉片，亦可侵染忽花苔，初期葉片出現白色小斑點，逐漸擴大，嚴重時佈滿全葉，因產生大量分生孢子而呈現灰白色。病斑後期常會產生圓形子囊殼，初期為白色漸轉為橙色，成熟時為黑色。

傳播途徑：主要靠風力傳播

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
50%克收欣 水分散性粒劑 (Kresoxim-methyl)	0.35公斤	3,000	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續二次。	1.採收前3天停止施藥。 2.對水生物劇毒，勿使用於「飲用水水源水質保護區」及「飲用水取水口一定距離內之地區。」
5%三泰隆 可濕性粉劑 (Triadimenol)	0.5公斤	2,000	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續二次。	採收前12天停止施藥。
18%賽福寧乳劑 (Triforine)	1公升	1,000	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續二次。	1.採收前21天停止施藥。 2.具眼刺激性。
99%礦物油乳劑* (Petroleum oil)	2-2.5公升	500	發病初期開始施藥，每隔7天施藥一次，連續二次。	藥液噴施時，必須均勻覆蓋葉面、葉背及植珠。
500g/L 氟殺克敏 水懸劑* (Fluxapyroxad + Pyraclostrobin)	0.2-0.6公升	5,000	病害發生初期開始施藥，必要時隔7天施用一次。	採收前7天停止施藥。

\*延伸使用藥劑