

## 三十四、茭白筍胡麻葉枯病

學名：*Helminthosporium zizaniae* Nishikado

英名：brown leaf spot

病徵：

主要危害葉片。罹病初期在葉面發生褐色小斑點，逐漸擴大成胡麻粒狀或橢圓之暗褐色病斑，周圍具淡黃色暈環。下位葉罹病程度高於上位葉。後期病斑會相互愈合，而逐漸由葉緣向下延伸之枯黃色塊狀枯死。葉鞘受害則呈不規則之淡褐色大病斑。

傳播途徑：

本病菌可藉由空氣及筍農採筍後棄置田間的葉片、殘株傳播。砂質壤土之茭白筍園，因土壤貧瘠及保肥力差，易發生此病害。

防治方法：

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
23.7%依普同 水懸劑 (Iprodione)	1公升	1,000	發病初期開始施藥，7天後再施藥一次，連續二次。	採收前6天停止施藥。
33%鋅錳乃浦 水懸劑* (Mancozeb)	2.5公升	400	分藥盛期施藥一次，經14天再施藥一次。	1.採收前20天停止施藥。 2.施藥次數不得超過4次。
37%錳乃浦 水懸劑* (Maneb)	1.67公升	600	分藥盛期施藥一次，經14天再施藥一次。	採收前20天停止施藥。

\*延伸使用藥劑