

七、十字花科作物鱗翅目害蟲、金花蟲類

| 藥劑名稱 | 每公頃每次施藥量 | 稀釋倍數(倍) | 施藥方法 | 注意事項 |
|----------------------------------|---------------|---------|-----------------------|--|
| 40%納乃得水溶性粒劑* (Methomyl) | 0.2-0.7 公斤 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 小葉菜類採收前4天、包葉菜類及根菜類採收前6天、乾豆類採收前35天停止施藥。 |
| 25%納乃得水溶性粉劑* (Methomyl) | 0.3-1.3 公斤 | 800 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 小葉菜類採收前4天、包葉菜類及根菜類採收前6天、乾豆類採收前35天停止施藥。 |
| 40%納乃得水溶性粉劑* (Methomyl) | 0.2-0.7 公斤 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 小葉菜類採收前4天、包葉菜類及根菜類採收前6天、乾豆類採收前35天停止施藥。 |
| 40%納乃得水溶性粉劑-水溶性袋裝* (Methomyl) | 0.2-0.7 公斤 | 1,500 | 害蟲發生時開始施藥，必要時隔7天施藥一次。 | 小葉菜類採收前4天、包葉菜類及根菜類採收前6天、乾豆類採收前35天停止施藥。 |

*延伸使用藥劑