

十二、十字花科蔬菜擬尺蠖

學名：*Trichoplusia ni* Hubner

英名：Cabbage looper

危害作物：瓜類、豆類、番茄、麻、甘藍、白菜……等。

生活習性：

年約發生五至六世代，卵散生，幼蟲自葉裏穿孔而食，排泄濃綠色糞便於葉上或地上，其步行作尺蠖狀。幼蟲老熟後，即在葉背作橢圓形之白色薄繭化蛹。

防治方法：任選下表一種藥劑防除

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
58%乃力松乳劑 (Naled)	0.5-1 公升	1,000	每隔7至10天施藥一次。	採收前4天停止施藥。
25%拜裕松乳劑 (Quinalphos)		500	每隔7至10天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
26.3%亞特松乳劑 (Pirimiphos -methyl)	1-2公升	500	每隔7至10天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
20%芬化利 水基乳劑 (Fenvalerate)	0.15- 0.25公升	3,000	每隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
20%芬化利乳劑 (Fenvalerate)	0.15- 0.25公升	3,000	每隔7天施藥一次。	採收前14天停止施藥。
20%芬化利 可濕性粉劑 (Fenvalerate)		5,000	每隔7至10天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
20%芬化利片劑 (Fenvalerate)		5,000	每隔7至10天施藥一次。	採收前7天停止施藥。
5%芬化利乳劑 (Fenvalerate)	0.5公升	2,000	每隔7天施藥一次。	採收前10天停止施藥。
3%蘇力菌 可濕性粉劑(每公 克含300億孢子) (<i>Bacillus thuringiensis</i>)	0.4-0.6 公斤	1,500	每隔7天施藥一次。	採收前亦可施用。
10%百滅寧 可濕性粉劑 (Permethrin)		3,000	每隔7天施藥一次。	採收前2~4天停止施藥。
10%百滅寧乳劑 (Permethrin)		3,000	每隔7天施藥一次。	採收前2~4天停止施藥。
5%賽滅寧 可濕性粉劑 (Cypermethrin)		1,500	每隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。

藥劑名稱	每公頃每次施藥量	稀釋倍數(倍)	施藥方法	注意事項
5%賽滅寧微乳劑 (Cypermethrin)		1,500	每隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
5%賽滅寧乳劑 (Cypermethrin)		1,500	每隔7天施藥一次。	採收前6天停止施藥。
50%加保利 可濕性粉劑 (Carbaryl)		1,000		採收前7天停止施藥。
85%加保利 可濕性粉劑 (Carbaryl)		1,700		採收前7天停止施藥。

TACTRI

